

内痔核に対する各手術方法の比較

手術方法	治療期間	入院期間を含めた平均休業期間	術後の痛み	再発	長所	短所	肛門疾患診療ガイドライン推奨度	手術実績(件)
マクギブニー-輪ゴム結紮術	日帰り	0~1日	あり(約7~14日間)	少ない	① 日帰りで簡単にできる② 再発が少ない	① 大きな内痔核にはできない② 1回に1個しかできない	B	386 (1988年1月19日~2020年12月31日)
ジオンによる硬化療法	日帰り	約4.3日	軽い	多い 16年間の累積再発率： 13.7%	① 術後の痛みが軽い② 日帰りでできる③ 早く就業できる	① 外痔核成分の大きな内外痔核には効かず② 再発が多い	B	75 (2000年1月1日~2020年12月31日)
結紮切除術	入院(約8.3日間)	約16.4日	強い	少ない 16年間の累積再発率： 3.4%	① 確実である② 再発が少ない	① 痛みが強い② 入院・休業が長い	A	339 (2000年1月1日~2020年12月31日)
PPH	入院(約5.7日間)	約8.6日	6割は痛みどめの注射をするが日ごとに軽快	少ない 16年間の累積再発率： 2.5%	① 痛みが軽い② 入院が短い③ 早く就業できる④ 再発が少ない	慢性特発性直腸肛門痛がまれにある(0.2%)	C	1094 (2000年1月1日~2020年12月31日)