

内痔核に対する各種手術方法の比較

手術方法	治療期間	入院期間を含めた平均休業期間	術後の痛み	再発	長所	短所	肛門疾患診療ガイドライン推奨度	手術実績(件)
マクギブニ-輪ゴム結紮術	日帰り	0~1日	あり (約7~14日間)	少ない	① 日帰りで簡単にできる②再発が少ない	①大きな内痔核にはできない②1回に1個しかできない	B	412 (1988年1月19日~2021年12月31日)
ジオンによる硬化療法	日帰り	約4.3日	軽い	多い 16年間の累積再発率： 13.7%	①術後の痛みが軽い②日帰りでできる③早く就業できる	①外痔核成分の大きな内外痔核には効かず②再発が多い③稀に敗血症、直腸潰瘍・狭窄、直腸腔瘻あり。	B	81 (2000年1月1日~2021年12月31日)
結紮切除術	入院 (約8.3日間)	約16.4日	強い	少ない 16年間の累積再発率： 3.4%	①確実である②再発が少ない	①痛みが強い②入院・休業が長い	A	345 (2000年1月1日~2021年12月31日)
PPH	入院 (約5.7日間)	約8.6日	6割は痛みどめの注射をするが日ごとに軽快	少ない 16年間の累積再発率： 2.5%	①痛みが軽い②入院が短い③早く就業できる④再発が少ない	慢性特発性直腸肛門痛がまれにある(0.2%)	C	1121 (2000年1月1日~2021年12月31日)